

## Подберёзовик болотный - *Leccinum holopus*

Автор: Дарвита

11.04.2011 13:20 - Обновлено 11.04.2011 17:49

---

{phocagalleryview=category|categoryid=98|imageid=0|limitstart=0|limitcount=1|fontcolor=#B88A00|bgcolor=#eedc82|bgcolorhover=#d5d5d5|imagebgcolor=#cadaba|bordercolor=#B88A00|bordercolorhover=#86B300|detail=1|displayname=0|displaydetail=1|displaydownload=0|float=left}

Этот гриб недаром так называется. Растёт он в сырых местах под берёзами или даже на берёзовом болоте. Подберёзовик болотный по сравнению с другими своими родственниками более квёлый, тощий, сырой. У него светлая шляпка, которая в старости становится зеленоватой. Трубочки, в отличие от других подберёзовиков, не бело-кремовые, а белые, и быстро сереют даже у молодых экземпляров. Трубчатый слой имеет крупные поры, как у козляков. Ножка обычно тонкая, волокнистая, жесткая и невкусная. Только молодые грибы лучше всего собирать и употреблять в пищу. Грибы постарше, не говоря уже о зрелых, просто не донести до дому - они превращаются в вязкое месиво весьма противного вида. Не хочется их носить в корзине, тратя свои силы,

чтобы потом просто выбросить.

На вкус подберёзовик болотный весьма хорош и съедобен. Мы его берём иногда в молодом возрасте, обычно только шляпки.

Однажды мы видели лесное диво. Подберёзовик болотный вырос не на земле, а довольно высоко на стволе сломанной гнилой берёзы. Как так получилось, что мицелий гриба поднялся высоко по стволу, мы не знаем. В нашей фотогалерее есть фото этого чуда.